



Tacrolimus (Prograf^{MC}) (Advagraf^{MC})

CLASSE :

Immunosuppresseur

Effets

- ◆ Diminue le risque de rejet d'une greffe d'organe.

Indications

- ◆ Arthrite rhumatoïde.
- ◆ Prévention du rejet de greffe cardiaque.
- ◆ Prévention du rejet de greffe hépatique.
- ◆ Prévention du rejet de greffe rénale.

Mode d'administration

- ◆ Généralement deux prises par jour pour le Prograf et une prise par jour pour l'Advagraf.
- ◆ A prendre régulièrement, aux mêmes moments de la journée.

Tacrolimus (Prograf^{MC}) (Advagraf^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Céphalées (maux de tête).
- ◆ Diarrhées ou constipation.
- ◆ Diminution de l'appétit.
- ◆ Douleurs abdominales, nausées, vomissements.
- ◆ Tremblements.
- ◆ Baisse des globules blancs et rouges qui peut se manifester par fièvre, frissons, maux de gorge ou infections. Contactez immédiatement votre médecin si cela se produit.

Précautions

- ◆ Éviter la prise de pamplemousse ou de son jus durant le traitement.
- ◆ Prendre au même moment par rapport aux aliments, c'est-à-dire que si vous le prenez à jeun, prenez-le toujours à jeun. Et si vous le prenez avec de la nourriture, prenez-le toujours avec de la nourriture.
- ◆ Vous devez prévenir immédiatement votre médecin en cas d'infection, d'ecchymose non expliquée, ou de saignement.
- ◆ Si vous souhaitez prendre un médicament ou un produit de santé naturel par vous-même, avertissez systématiquement un professionnel de la santé qui pourra juger si cela est compatible avec votre condition ou votre médication.
- ◆ Conduite pour les doses oubliées :
 - Si vous oubliez une dose d'ADVAGRAF®, prenez-la le plus tôt possible dans la journée. Ne pas doubler la dose du lendemain.
 - Si vous oubliez une dose de PROGRAF®, attendez à la prochaine dose et reprendre l'horaire régulier. Ne doublez pas la dose suivante.

Notes
