

Pré-visite

Trajectoire ambulatoire: Rougeole

**Signes et symptômes**  
 Fièvre élevée (38,3° C)  
**ET**  
 Conjonctivite OU coryza OU écoulement nasal  
**ET**  
 Éruption maculopapulaire (cutanée et/ou buccale)

**Présentation atypique (atténuée) :**  
 - Incubation plus longue (17-21 jours)  
 - Fièvre moins élevée (souvent <39°C)  
 - Congestion nasale, toux, conjonctivite rarement présents  
 - Rash peut être localisé et vésiculaire

Usager en ambulatoire: cliniques externes et spécialisées, imagerie et plateaux techniques

Appel téléphonique (questions sur le risque infectieux) et envoi message Komutel par la centrale des rendez-vous (Pour l'ETO, rappel téléphonique 48h avant)

Suspicion/ confirmation de rougeole ou contact significatif non immun ou vulnérable?

Non

Attribuer rendez-vous tel que prévu

Oui

-Remettre le patient en attente  
-Aviser le patient de contacter la **santé publique de sa région** ou le **811**

Non prioritaire

• Rendez-vous reporté après la période de contagiosité/ surveillance  
• Aviser la PCI

Prioritaire

• Aviser secrétaire médicale qui communiquera avec médecin traitant  
• Planifier prendre en charge le patient à l'urgence en suivant l'**algorithme de l'urgence** et aviser au préalable l'urgentologue et le coordonnateur d'activités. Le coordonnateur d'activités doit aviser le microbiologiste, la PCI et le Bureau de santé.  
• Aviser l'usager de porter un masque de procédure dès le départ du domicile et d'éviter les lieux publics/ les transports en commun

Un usager suspecté ou confirmé pour la rougeole ou un contact significatif non-immun ou vulnérable ne devrait pas se présenter à l'ICM dans sa période de contagiosité/ de surveillance.

Arrivée de l'usager à l'ICM (selon la politique en vigueur, port du masque de procédure)

Suspicion/ confirmation de rougeole ou contact significatif non immun ou vulnérable?

Non

Rendez-vous en clinique

-Procéder à l'hygiène des mains de l'usager ET lui donner un masque de procédure pour qu'il le porte dès que possible (faire porter Medicom à l'usager si possible).  
-Appliquer des **précautions aériennes-contact** (gants, jaquette, masque N95) et si l'usager est présentement dans une la salle d'examen, maintenir la porte fermée en tout temps.  
-Ne pas faire attendre l'usager dans le corridor ou dans la salle d'attente ET limiter au maximum les déplacements du patient.  
-Aviser le plus rapidement possible le médecin traitant de la présence de l'usager (si ce n'est pas déjà fait) et déterminer la possibilité de reporter le rendez-vous.

**Important:**  
-Limiter au minimum le nombre d'intervenants et d'interventions  
- **Maintenir un registre des patients et du personnel qui auraient pu être exposés au cas confirmé ou suspecté en se fiant à la définition d'exposition significative**

ICM

-Accompagner le patient à l'urgence sans tarder (civière 18 ou 23, utiliser au besoin ascenseur #21 ou # 22 ) et aviser au préalable l'urgentologue et le coordonnateur d'activités.  
-Avant tout déplacement avec le patient, s'assurer que l'unité de soins/ secteur receveur est avisé et prêt pour le transfert.  
- Le coordonnateur d'activités avise le microbiologiste, la PCI et le Bureau de santé.  
- Le médecin traitant ou le microbiologiste avise la **Direction de la santé publique de Montréal** (514-52-8-2400).  
-Aviser la sécurité pour condamner les espaces visités par le patient jusqu'à 1h45 après son passage ou lorsqu'un renouvellement d'air de 99,9% est complété (voir le Tableau délai d'attente requis selon le nombre de renouvellements d'air à l'ICM).  
- Aviser l'équipe d'hygiène et salubrité pour la désinfection des lieux où le patient a circulé.

Possibilité de reporter le rendez-vous après la période de contagiosité/surveillance avec accord médical?

Non

Oui

-Aviser l'usager que le rendez-vous est reporté à une date qui lui sera communiquer ultérieurement et le diriger vers la sortie de l'hôpital sans tarder accompagné d'un membre du personnel.  
-Aviser l'usager de retourner à domicile en évitant tous lieux publics/ transports en commun, de s'isoler volontairement à domicile et d'appeler la direction de **santé publique de sa région** ou le **811**.  
-Aviser le microbiologiste, la PCI et le Bureau de santé.  
-Aviser la sécurité pour condamner les espaces visités par le patient jusqu'à 1h45 après son passage ou lorsqu'un renouvellement d'air de 99,9% est complété (voir le Tableau délai d'attente requis selon le nombre de renouvellements d'air à l'ICM).  
- Aviser l'équipe d'hygiène et salubrité pour la désinfection des lieux où le patient a circulé.