



## Warfarine (Coumadin<sup>MC</sup>), Nicoumalone (Sintrom<sup>MC</sup>)

CLASSE :  
Anticoagulant

### Effets

- ◆ Éclaircit le sang.

### Indications

- ◆ Prévention de l'accident vasculaire cérébral (AVC) causé par les troubles du rythme cardiaque.
- ◆ Thrombose.
- ◆ Porteur de valve(s) mécanique(s)
- ◆ Porteur d'assistance ventriculaire (HeartMate II)
- ◆ Infarctus (crise cardiaque)

### Mode d'administration

- ◆ Prendre régulièrement à la même heure chaque jour.
- ◆ En cas d'oubli, prenez la dose le plus tôt possible. Si vous vous en apercevez le lendemain, prenez la quantité normale prescrite. Ne pas doubler la dose.
- ◆ Soyez fidèle à vos prises de sang, elles permettent d'évaluer votre réponse à ce médicament.
- ◆ Utilisez un calendrier pour y inscrire la dose à prendre chaque jour et cochez la date lorsque vous l'avez pris. Vous vous assurerez ainsi de ne pas oublier de prendre votre médicament, ni de le prendre en double.

## Warfarine (Coumadin<sup>MC</sup>), Nicoumalone (Sintrom<sup>MC</sup>)

### Effets secondaires possibles

- ◆ Le Saignement inhabituel : nez, gencives, urines, selles noires, menstruations plus abondantes, ecchymoses (bleus). Avisez votre médecin ou pharmacien si cela se produit.

### Précautions

- ◆ Son effet peut être modifié par plusieurs médicaments et aliments. **Mentionnez toujours la prise de ce médicament si vous consultez un autre médecin ou pharmacien.**
- ◆ Toujours demander conseil à votre pharmacien avant de prendre des médicaments en vente libre.
- ◆ Il existe un bracelet en vente libre dans les pharmacies. Vous pourriez vous en procurer un ou conserver sur vous une carte indiquant que vous prenez ce médicament.
- ◆ Éviter l'abus d'alcool car il pourrait modifier l'effet du médicament.
- ◆ Si vous devez subir une intervention dentaire ou une chirurgie, mentionnez la prise de ce médicament avant l'intervention.

### Notes

- ◆ Pour plus d'informations, se référer à la brochure « les Anticoagulants »