



Acebutolol (Monitan^{MC}), Aténolol (Tenormin^{MC}), Bisoprolol (Monacor^{MC}), Carvedilol (Coreg^{MC}), Metoprolol (Lopresor^{MC}), Nadolol (Corgard^{MC}), Propranolol (Indéral^{MC})

CLASSE :

β-bloqueurs

Effets

- ◆ Ralentit les battements du cœur, ce qui demande à celui-ci moins d'efforts.

Indications

- ◆ Hypertension
- ◆ Angine
- ◆ Fibrillation auriculaire (FA)
- ◆ Insuffisance cardiaque

Mode d'administration

- ◆ Prenez ce médicament régulièrement aux mêmes heures, chaque jour, avec ou sans nourriture.
- ◆ Ne jamais cesser de prendre le médicament sans l'autorisation de votre médecin.
- ◆ Si l'on prescrit un médicament à action prolongée (SR), prenez-le tel quel sans le croquer ni l'écraser.

Acebutolol (Monitan^{MC}), Aténolol (Tenormin^{MC}), Bisoprolol (Monacor^{MC}), Carvedilol (Coreg^{MC}), Metoprolol (Lopresor^{MC}), Nadolol (Corgard^{MC}), Propranolol (Indéral^{MC})

Effets secondaires possibles

- ◆ Étourdissements (au début) : soyez prudent lorsque vous vous levez du lit ou d'une chaise.
- ◆ Fatigue (au début) : souvent due à une baisse de pression, diminuera avec le temps
- ◆ Extrémités froides : circulation sanguine ralentie dans les doigts et les orteils.
- ◆ Troubles sexuels possible chez les hommes: parlez-en à votre médecin.

Précautions

- ◆ Demandez de vous faire expliquer comment prendre votre pouls. Vous pourrez le vérifier vous-même à la maison. Consultez votre médecin si votre cœur bat moins de 50 fois par minute

Notes
