

**2.101.3 – ORDONNANCE PRÉ-IMPRIMÉE
ANTIBIOPROPHYLAXIE PRÉ-PROCÉDURE
STRUCTURALE**

Date de la procédure : _____
Poids : _____ kg Taille : _____ cm

I. INDICATIONS


- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Valve _____ trans-cathéter par voie <u>trans-fémorale</u> | <input type="checkbox"/> Mitraclip |
| <input type="checkbox"/> Valve _____ trans-cathéter par approche <u>alternative</u> | <input type="checkbox"/> Triclip |
| <input type="checkbox"/> Fermeture de CIA/FOP/CIV | <input type="checkbox"/> Fermeture d'appendice auriculaire |
| <input type="checkbox"/> Réparation de coarctation de l'aorte | <input type="checkbox"/> Fermeture de canal artériel |
| <input type="checkbox"/> Autres : _____ | <input type="checkbox"/> Fermeture de fuite para valvulaire |

II. ALLERGIE(S) / INTOLÉRANCE(S) AUX ANTIBIOTIQUES

Se référer à l'algorithme décisionnel **pour déterminer la sévérité de l'allergie**

- Absence d'antécédent d'allergie sévère aux β -lactamines (pénicillines, céphalosporines, carbapénèmes)
- Antécédent d'allergie sévère aux β -lactamines (pénicillines, céphalosporines, carbapénèmes)
- Antécédent d'allergie sévère aux β -lactamines (pénicillines, céphalosporines, carbapénèmes) **ET à la vancomycine**
- Si patient sous antibiothérapie, valider avec la pharmacie si la couverture est optimale

ALGORITHME DÉCISIONNEL POUR L'ANTIBIOPROPHYLAXIE EN CAS D'ALLERGIE AUX B-LACTAMINES



■ Appliquer le traitement antibiotique tel que prévu à la section administration

Signature du prescripteur : _____	Date : _____	Heure : _____
-----------------------------------	--------------	---------------



2.101.3 – ORDONNANCE PRÉ-IMPRIMÉE
ANTIBIOPROPHYLAXIE PRÉ-PROCÉDURE
STRUCTURALE

III. ADMINISTRATION

Bien inscrire l'heure réelle d'administration sur la FADM

Si procédure annulée et reportée : répéter l'administration des antibiotiques selon le même horaire

- Si le patient est en isolement préventif ou que le statut SARM est non disponible au moment de l'application de l'OPI, appliquer les directives du statut SARM négatif

■ Si absence d'antécédent d'allergie sévère aux β-lactamines (pénicillines, céphalosporines, carbapénèmes)

■ **Statut SARM négatif**

- Poids < 120 kg : **Céfazoline** (*Ancef^{MD}*) 2 g IV en 15 minutes
 - Poids ≥ 120 kg : **Céfazoline** (*Ancef^{MD}*) 3 g IV en 15 minutes
- } À l'appel ou à 6 h 00 pour le 1^{er} cas du matin
À répéter en salle si dernière dose reçue depuis plus de 3 heures

■ **Statut SARM positif ou alerte présomptive** (tel qu'indiqué dans le résultat de laboratoire)

Vancomycine ET Céfazoline (*Ancef^{MD}*)

- Poids ≤ 83 kg : **Vancomycine** 1 g IV en 60 minutes
 - Poids 83 à 116 kg : **Vancomycine** 1,5 g IV en 90 minutes
 - Poids ≥ 116 kg : **Vancomycine** 2 g IV en 120 minutes
- } Administrer à 6 h 00 pour les 3 premiers cas
Administrer à 10 h 00 pour les cas suivants
- ET**
- Poids < 120 kg : **Céfazoline** (*Ancef^{MD}*) 2 g IV en 15 minutes
 - Poids ≥ 120 kg : **Céfazoline** (*Ancef^{MD}*) 3 g IV en 15 minutes
- } Administrer à 5 h 00 pour les 3 premiers cas
Administrer à 10 h 00 pour les cas suivants
- } Administrer à 6 h 00 pour le 1^{er} cas du matin ou à l'appel
À répéter en salle si dernière dose reçue depuis plus de 3 heures

■ Si antécédent d'allergie sévère aux β-lactamines (pénicillines, céphalosporines, carbapénèmes)

■ **Peu importe le statut SARM**

- Poids ≤ 83 kg : **Vancomycine** 1 g IV en 60 minutes
 - Poids 83 à 116 kg : **Vancomycine** 1,5 g IV en 90 minutes
 - Poids de ≥ 116 kg : **Vancomycine** 2 g IV en 120 minutes
- } Administrer à 6 h 00 pour les 3 premiers cas
Administrer à 10 h 00 pour les cas suivants
- } Administrer à 5 h 00 pour les 3 premiers cas
Administrer à 10 h 00 pour les cas suivants

■ Si antécédent d'allergie sévère aux β-lactamines (pénicillines, céphalosporines, carbapénèmes) ET à la vancomycine

■ **Statut SARM négatif**

- **Clindamycine 900 mg** IV en 30 minutes
- } Administrer à 6 h 00 pour les premiers cas,
Administrer à l'appel pour les cas suivants
À répéter en salle si dernière dose reçue depuis plus de 4 heures

- **Statut SARM positif** : contacter le pharmacien