



### I. INDICATIONS

La prescription d'une trousse de naloxone est recommandée si l'utilisateur répond à une des indications ci-dessous :

- Thérapie de substitution d'opioïdes en cours
- Prise quotidienne d'opioïdes équivalent à plus de 50 mg de morphine par jour
- Utilisation de > 2 opioïdes différents (différentes voies d'administration ou durée d'action, combinaison de molécules)
- Utilisation concomitante de dépresseurs du système nerveux central (benzodiazépines, alcool, etc.)
- Présence de comorbidités pouvant augmenter le risque de surdose : insuffisance rénale, insuffisance hépatique, apnée du sommeil, MPOC, etc.
- Antécédent de surdose aux opioïdes, trouble d'utilisation de drogues injectables ou de rue
- Membre de la famille, proche aidant, ami d'un patient à risque de surdose d'opioïdes

### II. MODE D'ADMINISTRATION

- Naloxone 0,4 mg IM q 3-5 min (1 trousse disponible à l'urgence de l'ICM)
- Naloxone 4 mg vaporisation intranasale q 3-5 min (Non disponible à l'ICM. Référer le patient à une pharmacie communautaire ou à un organisme)

### III. DISTRIBUTION

- Pharmacie communautaire : \_\_\_\_\_  
<https://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/naloxone/>  
Adresse : \_\_\_\_\_ # Téléphone : \_\_\_\_\_
- Organisme : \_\_\_\_\_
- Institut de Cardiologie de Montréal. Trousse remise # \_\_\_\_\_

Signature du professionnel : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_ Heure : \_\_\_\_\_