INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

Université de Montréal

ICM300

2.24 – ORDONNANCE PRÉ-IMPRIMÉE
D'analgésie au congé du SAPO

***Cette ordonnance annule l'ordonnance pré-imprimée SAPO 2.23**

I - ANALGÉSIE

- ❑ **Acétaminophène** (*Tylenol*[MD]) 650 mg PO/IR q 6 h PRN
- ❑ **Acétaminophène** (*Tylenol*[MD]) 975 mg PO/IR q 6 h PRN

- ❑ **Morphine** (*Statex*[MD]) _____ mg PO ❑ q 4 h PRN ou ❑ q 6 h PRN
- ❑ **Morphine** (*Statex*[MD]) _____ mg PO q 2 h PRN **en entre-doses**

OU

- ❑ **Hydromorphone** (*Dilaudid*[MD]) _____ mg PO ❑ q 4 h PRN ou ❑ q 6 h PRN
- ❑ **Hydromorphone** (*Dilaudid*[MD]) _____ mg PO q 2 h PRN **en entre-doses**

II - CO-ANALGÉSIE

- ❑ **Prégabaline** (*Lyrica*[MD]) _____mg PO BID
- ❑ Autres : _____

III - LAXATIFS (CESSER SI DIARRHÉE)

- ■ **Sennosides** (*Senokot*[MD]) 8,6 mg ❑ 1 co ou ❑ 2 co PO HS ad reprise des selles
- ■ Se référer au protocole 3.20 - Prévention et traitement de la constipation

IV - ANTI-ÉMÉTIQUES

- ❑ **Ondansetron** (*Zofran*[MD]) 4 mg IV q 12 h PRN

N.B. : Si réapparition de douleurs, aviser le médecin

Signature de l'anesthésiologiste : _____	**Date :** _____ **Heure :** _____