



* I C M 3 0 0 *

**2.25 – ORDONNANCE PRÉ-IMPRIMÉE
CATHÉTER CENTRAL INSÉRÉ
PAR VOIE PÉRIPHÉRIQUE (CCIVP) [PICC LINE]**

DATE

A	M	J
---	---	---

NUMÉRISER ET ENVOYER CETTE ORDONNANCE À LA PHARMACIE

I. CATHÉTER CENTRAL INSÉRÉ PAR VOIE PÉRIPHÉRIQUE (CCIVP)

Type : Avec valve Sans valve Autre, préciser :

Nombre de voies : 1 voie 2 voies 3 voies

Calibre : 4 F 5 F 6 F

Longueur installée : _____ cm

II. INTERVENTIONS

- Après l'installation du cathéter, s'assurer d'avoir un bouchon à chaque voie
- Pansement : changer tous les 7 jours si le site est recouvert d'une pellicule transparente ou toutes les 48 heures si le site est recouvert de compresses propres. Se référer à la technique de soins 7.3.
- Occlusion du cathéter :
 - Vérifier si présence de pliure ou de torsion du cathéter et corriger s'il y a lieu
 - S'assurer que le pansement n'entrave pas la fluidité dans le cathéter
 - Changer le bouchon de la voie occluse
 - Si l'occlusion persiste, aviser le médecin afin d'obtenir une prescription pour appliquer le protocole 3.26 - Altéplase à faible dose (*Cathflo^{MD}*)
- Retrait du CCIVP :
 - Peut être effectué par les infirmières ayant les pré-requis suivants :
 1. Lecture de la technique 8.3
 2. Acquisition pratique sous surveillance d'une personne habilitée
(Pour informations supplémentaires, communiquer avec l'équipe en accès vasculaire au poste 2713)

III. MAINTIEN DE LA PERMÉABILITÉ

- Se référer au tableau sur le maintien de la perméabilité des cathéters veineux (Ordonnance collective 1.26)

Signature du médecin ou de l'infirmier (ère) de l'équipe d'accès vasculaire :

Date : _____ Heure : _____