



**2.72 – ORDONNANCE PRÉ-IMPRIMÉE
ADMINISTRATION DE BUPIVACAÏNE LOCAL
VIA DRAIN THORACIQUE**

NE PAS ADMINISTRER LA BUPIVACAÏNE PAR VOIE IV

L'infirmière qui applique cette ordonnance doit avoir lu la technique 14.14

I. INDICATIONS

Douleur en présence d'un drain thoracique

Douleur latéralisée du côté du drain

- Douleur augmentée à l'inspiration
- Inspiration bloquée par la douleur

II. CONTRE-INDICATIONS

ABSOLUE :

- Drain thoracique qui ne peut être clampé
- Allergie à la bupivacaïne
- Pneumothorax

RELATIVE (à valider avec le médecin)

- Drain thoracique qui draine ≥ 100 mL/h
- Hypotension : tension systolique ≤ 80 mmHg
- Allergie au latex (en cas d'allergie au latex, se référer à la technique de soins 14.14 pour la procédure à respecter)

III. MÉDICATION

- Pour les indications, contre-indications, effets secondaires et méthode d'administration, se référer à la technique de soins 14.14.

Drain pleural

- Bupivacaïne (Marcaïne^{MD}) 0,5 % 10 mL q 4 heures PRN via drain pleural x 1 drain
- Bupivacaïne (Marcaïne^{MD}) 0,5 % 10 mL q 4 heures PRN via drain pleural x 2 drains

Si < 45 kg :

- Bupivacaïne (Marcaïne^{MD}) 0,5 % ____ mL q 4 heures PRN via drain pleural x 1 drain

Drain médiastinal

- Bupivacaïne (Marcaïne^{MD}) 0,5 % 10 mL q 4 heures PRN via drain médiastinal

Si < 45 kg :

- Bupivacaïne (Marcaïne^{MD}) 0,5 % ____ mL q 4 heures PRN via drain médiastinal

Drain blake

- Bupivacaïne (Marcaïne^{MD}) 0,5 % 10 mL q 4 heures PRN via drain médiastinal

Si < 45 kg :

- Bupivacaïne (Marcaïne^{MD}) 0,5 % ____ mL q 4 heures PRN via drain médiastinal

IV. ADMINISTRATION

- Injecter la bupivacaïne (Marcaïne^{MD}) selon la technique de soins 14.14
- Inscire toute dose de bupivacaïne administrée via drain thoracique (pleural et médiastinal) dans la feuille d'administration des médicaments (FADM) et la double vérification

Signature de l'anesthésiologiste :

Date : ____ / ____ / ____ Heure : ____



**2.72 – ORDONNANCE PRÉ-IMPRIMÉE
ADMINISTRATION DE BUPIVACAÏNE LOCAL
VIA DRAIN THORACIQUE**

NE PAS ADMINISTRER LA BUPIVACAÏNE PAR VOIE IV

V. SOINS ET SURVEILLANCE

- Surveiller l'état hémodynamique du patient et les signes vitaux selon la routine de l'unité de soins
- Évaluer la douleur 15 minutes après l'injection de la bupivacaïne et selon la routine en vigueur sur l'unité de soins
- Surveiller les signes de toxicité à la bupivacaïne
- Surveiller les signes de toxicité q 8 h, avant et après l'administration de bupivacaïne par l'infirmière via drain thoracique

Signes de toxicité :

FRÉQUENTS	RARES
<ul style="list-style-type: none">▪ Acouphène▪ Paresthésie labiale▪ Sensation gustative de métal▪ Sensation de tête légère	<ul style="list-style-type: none">▪ Diplopie▪ Convulsions▪ Coma▪ Arrêt respiratoire

Aviser l'anesthésiologiste ou le médecin et cesser l'administration de bupivacaïne via drain thoracique si présence d'un signe de toxicité.