



## 2.82 – ORDONNANCE PRÉ-IMPRIMÉE PRÉPARATION À LA COLONOSCOPIE

Date de la procédure : \_\_\_\_\_

Heure prévue : \_\_\_\_\_

### I. CONTRE-INDICATIONS À LA PRÉPARATION À LA COLONOSCOPIE

- Grossesse
- Obstruction ou perforation intestinale
- Iléus
- Rétention gastrique
- Maladie inflammatoire de l'intestin sévère et aigue
- Diminution du niveau de conscience
- Allergie à un des ingrédients de la préparation
- Risque d'aspiration lors de l'administration de la préparation
- Iléostomie
- Mégacolon toxique

### II. MÉDICATION

- Cesser les suppléments de Fer PO 7 jours avant la procédure ou dès que possible
- Cesser l'héparine IV 6 heures avant la procédure
- Si patient anticoagulé, faire INR le matin de la procédure

**Considérer de cesser les anticoagulants et antiplaquettaires selon le risque de saignement de la procédure (biopsie), le risque de thrombose du patient et les caractéristiques de l'anticoagulant/antiplaquettaire pris par le patient**

#### Patients diabétiques :

- Omettre les hypoglycémisants oraux le matin de l'intervention
- Omettre les doses d'insuline habituelle dès que le patient est à jeun ou sous diète liquide
  - Insuline régulière (Humulin R ou Novolin ge Toronto) SC QID selon protocole 3.10 dès la veille de la procédure
  - Insulinothérapie IV selon protocole 3.11 et cesser protocole d'insuline SC

### III. PRÉPARATION COLIQUE POUR LA PROCÉDURE

#### La veille de la procédure

Préparation du Polyéthylène-glycol (*Peglyte<sup>MD</sup>*) :

Idéalement la préparation doit se faire en avance. Diluer de l'eau froide du robinet jusqu'à la ligne, bien dissoudre et mettre au frigo pour diminuer le goût et augmenter la tolérance.

#### Dès 16 h 00

- Polyéthylène-glycol (*Peglyte<sup>MD</sup>*) boire 240 mL aux 10 minutes\* pour un total de 4 litres

#### Dès 21 h 00

- Bisacodyl 10 mg PO la veille de la procédure

#### Le matin de la procédure

- Si évacuation de selles colorées après avoir reçu les 4 L totaux de préparation, administrer 2 L supplémentaire de Polyéthylène-glycol (*Peglyte<sup>MD</sup>*) le matin de l'intervention

\*Si le patient est incapable de boire 240 mL aux 10 minutes, un intervalle de temps plus long est acceptable pour autant qu'il ait terminé la préparation intestinale 4 à 6 heures avant l'examen.

### IV. DIÈTE POUR PRÉPARATION À LA COLONOSCOPIE

- Faxer l'ordonnance au Service de nutrition clinique au 514 593-2173
- Jr 2 et 3 avant l'examen : diète restreinte en fibres et résidus
- 24 h avant l'examen : diète liquide strict ad 2 heures avant procédure
- **Liquides clairs permis** : eau, bouillon de poulet ou de légumes, jus de fruits clairs sans pulpe, café, thé, tisane (sans lait ni crème), eau gazéifiée sans colorant, boisson gazeuse blanche, Jello couleur orange, supplément nutritionnel sans lactose et sans fibre
- **Liquides interdits** : liquides de couleur rouge, bleu, violet (ex : jus de raisins, boisson aux fruits), Jello rouge, lait, boisson de soya ou d'amandes, jus de tomates ou de légumes, eau gazéifiée avec colorant, cola

Signature du prescripteur : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_ Heure : \_\_\_\_\_